

VORSORGEPROGRAMM FÜR BETROFFENE MIT NACHGEWIESENEM GENETISCHEN DEFENKT BEI FAP

Beginn	Untersuchung	Häufigkeit
ab dem 10. Lebensjahr	Körperliche Untersuchung	einmal pro Jahr
	kleine Darmspiegelung (Rekto-Sigmoidoskopie), wenn Polypen entdeckt wurden: komplette Darmspiegelung (Koloskopie)	einmal pro Jahr
	Ultraschall der Bauchregion	einmal pro Jahr
	Ultraschall der Schilddrüse	einmal pro Jahr
	bei unklarem oder fehlendem molekulargenetischen Test: augenärztliche Untersuchung	einmalig
vor der vorsorglichen Dickdarm- und Mastdarmentfernung	erste Magenspiegelung (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie)	---
vor dem 20. Lebensjahr	vorsorgliche Operation mit Entfernung von Dickdarm und Mastdarm (Proktokolektomie)	---

nach der vorsorglichen Dickdarm- und Mastdarmentfernung	bei verbliebenem Mastdarmrest: Mastdarmspiegelung (Rektoskopie)	alle vier Monate
	bei komplett entferntem Mastdarm: Spiegelung der angelegten Dünndarmtasche (Pouchoskopie)	einmal pro Jahr
ab dem 30. Lebensjahr	Magenspiegelung (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie)	alle 3 Jahre
	wenn in der Magenspiegelung Polypen festgestellt wurden: Magenspiegelung (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie)	einmal pro Jahr